

狂 認識狂犬病

狂犬病是由**狂犬病病毒**引起的急性病**毒性腦膜腦炎**，人類一般是被感染**狂犬病病毒**的動物抓咬傷而致病。

! 流行病學



全球**150多個國家和地區**均有**狂犬病**，除南極洲以外，其他各洲都存在**狂犬病**。

- 1 全球每年約有60,000人死於**狂犬病**，95%以上的人類死亡病例發生在亞洲和非洲。
- 2 亞洲國家以印度、中國大陸、菲律賓及印尼病例數最多，印度每年死亡人數約20,000人，中國大陸每年死亡約2,000人。
- 3 目前無動物**狂犬病**病例國家或地區（非**狂犬病疫區**），包括英國、瑞典、冰島、愛沙尼亞、挪威（Svalbard群島除外）、紐西蘭、澳洲、日本、新加坡、美國夏威夷州及關島等。
- 4 臺灣於2013年7月起確認**野生動物（鼬獾）**感染**狂犬病毒**，因此屬於**狂犬病發生疫區**，國內目前疫情侷限於**鼬獾、白鼻心**等野生動物。



! 臨床症狀



最後因呼吸麻痺而導致死亡。

發病後其致死率幾乎達100%！

! 預防措施

狂犬病病毒分布於全球，出國赴**狂犬病流行地區**或於國內動物疫情發生縣市（山地鄰近地區）旅遊，應**避免接觸犬、貓、野生或不熟悉的動物**，以減少被動物抓咬傷之機會。



疾病管制署全球資訊網
www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TWCDC



Taiwan CDC
LINE@疾管家

防疫專線：1922

廣告

預防狂犬病 小心別抓



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



傳染媒介

哺乳類動物，例如犬、貓、猴子、蝙蝠、鼬獾、浣熊、狐狸……等，都是傳染媒介。在開發中國家，犬、貓與人類生活密切關聯，為主要的傳染媒介。



傳染方式

主要是被患有狂犬病之動物咬傷，唾液中之病毒可經由抓、咬（或經由皮膚傷口、黏膜）而進入人體。



潛伏期

通常為1~3個月，短則不到一周，長則一年以上；視傷口嚴重程度、傷口部位神經分布的多寡或與腦的距離、病毒株別、病毒量、衣服的保护程度及其他因素等而定。



動物抓咬傷處置措施 1記 2沖 3送 4觀



1記

保持冷靜，「記」住動物特徵，切勿冒險捕捉。



2沖

立即以肥皂及大量清水「沖」洗15分鐘，並以優碘或70%酒精消毒傷口。



3送

儘速「送」醫，由醫師評估感染風險，消毒處理傷口、注射破傷風類毒素，及評估是否施打狂犬病免疫球蛋白或接受狂犬病暴露後預防接種。



4觀

儘可能，將咬人動物繫留「觀」察10天，瞭解其發病狀況。

遭受哺乳類動物抓咬傷，均需考量有否感染狂犬病毒之風險，無論在國內或國外，建議**儘速就醫**，由醫師依當地疫情及暴露情況作進一步評估。雖然狂犬病發病後的致死率極高，但如能在動物咬傷後接受妥適處置，可以有效降低發病的風險。

在國內遭受動物抓咬傷

1 請至「**人用狂犬病疫苗接種服務醫院**」就診，符合狂犬病暴露後預防接種條件者，由全民健保給付狂犬病免疫藥品費用。

2 人用狂犬病疫苗接種服務醫院名單，請至疾病管制署網站 (<https://www.cdc.gov.tw/>) 或撥打**防疫專線1922**查詢。



在國外旅遊期間遭受動物抓咬傷

1 應**立即於當地就醫**。
2 於國外接受狂犬病暴露後接種，但尚未完成所有劑次接種者，請於返國後，持國外遭動物咬傷就醫之診斷證明書或狂犬病疫苗接種紀錄或出入境證明等相關文件就醫，銜接未完成的疫苗劑次。

